

Ahmadi & Alvand, DDS, P.A.

Consentimiento informado para corona y puente fijo

Entiendo que el tratamiento de los dientes que requieren coronas o puentes fijos implica riesgos y posibles resultados no satisfactorios. No hay garantías en la longevidad de la obra de coronas o puentes fijos.

Acepto asumir los riesgos asociados con coronas y puentes, que incluyen, entre otros, los siguientes:

Reducción de la estructura del diente: Para reemplazar los dientes cariados o comprometidos de otra manera, es necesario modificar el diente o los dientes existentes para que las coronas o puentes fijos puedan colocarse sobre ellos.

Adormecimiento después del uso de anestesia local: En la preparación de dientes para coronas o puentes, generalmente se necesita anestesia local. Como resultado de la inyección o el uso de anestésicos, a veces puede haber hinchazón, mandíbula, sensibilidad muscular o incluso entumecimiento de la lengua, labios, dientes, mandíbula o tejido **facial que generalmente es temporal.**

Sensibilidad e incomodidad: A veces, después de la preparación de los dientes para coronas o puentes fijos, es posible que los dientes presenten sensibilidad o malestar. **La sensibilidad suele durar poco tiempo.** Las coronas y los puentes son artificiales y pueden sentirse diferentes a los dientes naturales.

La mayoría de los pacientes se acostumbran a esta sensación con el tiempo. Si la sensibilidad persiste, notifiquenos para que podamos determinar la causa y tratar de tratar el problema.

Las coronas o los pilares de los puentes pueden requerir un tratamiento de conducto.

Después de ser coronados, los dientes pueden desarrollar una condición llamada pulpitis o degeneración pulpar. Esto podría ser causado por un trauma de un accidente, caries profunda, preparación dental extensa para la corona u otras causas. **Puede ser necesario realizar una endodoncia en el diente afectado. Puede ser necesario un tratamiento de conducto. CORONA O PUENTE FIJO ROTO :**

En algún momento, el material utilizado para fabricar las coronas o los puentes posiblemente puede

astillarse o romperse con el tiempo. Muchos factores pueden contribuir a la rotura, incluida una fuerte mordida o golpes traumáticos.

Estética o apariencia: Los pacientes tendrán la oportunidad de observar y solicitar cambios en la apariencia de la corona o el puente antes de la cementación final. Entiendo que no es posible igualar exactamente el color de los dientes naturales. Después de la cementación final de coronas o puentes fijos **NO HAY CAMBIOS.** Con el tiempo, es posible que aparezca una línea oscura en la línea de las encías. Esto es causado por una recesión gingival natural. Si esto sucede, es posible que sea necesario reemplazar la corona o el puente. **Longevidad de coronas y puentes fijos:** Muchas variables determinan cuánto durarán las coronas y los puentes. Algunos factores son los mencionados anteriormente en los párrafos anteriores. Variables que incluyen la salud general del paciente, higiene oral, chequeos dentales regulares y dieta.

Como resultado, no se pueden hacer garantías con respecto a la longevidad de coronas y puentes. Las coronas y los puentes fijos deben mantenerse limpios. El cuidado meticuloso en el hogar es vital para evitar la caries recurrente y la falla final de la corona o el puente. Es responsabilidad del paciente buscar la atención del dentista si tienen algún problema con la corona o el puente. Un paciente debe seguir diligentemente todas las instrucciones, incluida la programación y la asistencia a todas las citas dentales. La cita para la corona y el puente debe completarse en un mes. Fallando su cita dental, especialmente la entrega final, puede resultar en una falla de la corona o puente. El ajuste incorrecto de la corona o el puente debido a citas perdidas puede causar la necesidad de una refabricación y cargos adicionales a su cargo. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre el propósito del tratamiento de coronas y puentes, y todas mis preguntas han sido respondidas. Acepto voluntariamente todos los riesgos, incluidos los enumerados anteriormente. Al firmar este documento, doy libremente mi consentimiento para permitir Dr, _____ para hacer cualquier tratamiento necesario aconsejado.

Firmar _____ fecha _____