

**TERAPIA DE ROOT CANAL**

**Entiendo que Terapia de Root Canal** incluye posibles riesgos inherentes, tales como, pero no limitado a lo siguiente, incluyendo el entendimiento de que no se han hecho promesas o garantías de resultados ni se espera:

- Los dientes tratados pueden seguir siendo de curso o incluso bastante doloroso para un periodo de tiempo, tanto durante, como después de la finalización del tratamiento. Si el dolor es severo o hinchazón ocurre, por favor llame a nuestra oficina inmediatamente. También hay una posibilidad de que se produzca adormecimiento y / o de persistir en la lengua, los labios, los dientes, mandíbulas, y / o los tejidos faciales que pueden ser resultado de la administración de la anestesia o de procedimientos de tratamiento. Este entumecimiento suele ser temporal, pero, en raras ocasiones, podría ser permanente.
- En algunos dientes, tratamiento de conducto convencional puede ser insuficiente. Si los canales están calcificados, si las raíces son excesivamente curvada o inaccesibles, pueden ocurrir cámara pulpar inadvertido o perforación de la raíz, lo que requiere la derivación a un especialista. Si hay una infección en el hueso que rodea el diente, la remisión a un especialista para la extracción o una apicectomía quirúrgico puede ser necesario.
- Dientes tratados conducto radicular deben ser protegidos. Durante y después del tratamiento, el diente en la mayoría de los casos tendrá sólo un relleno temporal. Si esto sale, por favor llámenos para un reemplazo. Es aconsejable para coronar o tapar un diente tan pronto como sea posible después de un tratamiento de conducto. Dientes tratados conductos radiculares pueden llegar a ser frágiles y debido a la estructura del diente, debilitado o reducido; dejar los dientes sometidos a las grietas, o fractura. Coronando o tapando el diente o los dientes tratados es la mejor medida de precaución para ayudar a evitar que esto ocurra.
- El tratamiento de conducto no siempre tiene éxito. Muchos factores influyen en el éxito: una adecuada inserción de tejido de las encías y el hueso de soporte; higiene oral; atención dental anterior y el presente; la salud general; trauma; preexistente, fracturas no detectadas raíces, accesorio o canales laterales, ect. A pesar de que un diente puede haber aparecido a ser tratados con éxito, siempre existe la posibilidad de un fracaso de hacer una cirugía adicional raíz (Apicectomía) o extracción necesario. Si un pilar de un puente o un diente coronado requiere tratamiento endodóntico, la posibilidad de perforación se ha mejorado debido a la anatomía oculta.
- Una corona pilar o corona (tapa) pueden estar dañados o destruidos durante la aplicación de goma dique, preparación de acceso, u otros procedimientos como parte de la terapia de endodoncia. Porcelana es particularmente susceptible a la fractura o formación de grietas y una tapa de porcelana existente puede tener que ser rehecho, particularmente si la pre-existente tapa es toda la porcelana en el diseño.
- Fractura de la raíz es una de las principales razones para el fracaso del conducto radicular. Por desgracia, las grietas "finas" son casi siempre invisible e indetectable. Las causas de la fractura de la raíz son el trauma, los dientes no estén protegidos adecuadamente, agrietamiento del diente, rellenos grandes, mordida incorrecta, desgaste excesivo, molienda habitual de los dientes, ect. Fractura de la raíz después o antes del tratamiento por lo general hace necesaria la extracción.
- Existen alternativas para el tratamiento de conducto. Estas alternativas (aunque no de elección) incluyen: ningún tratamiento; extracción; extracción seguida por un puente o colocación de prótesis parcial; y / o extracción seguido de implante y colocación de la corona.
- Debido a la fragilidad y de pequeño diámetro de los instrumentos de canal radicular se utilizan en el tratamiento de conducto, existe la posibilidad de la separación del instrumento (rotura) que puede o no puede ser detectado al momento del tratamiento.
- Los medicamentos, analgésicos y / o antibióticos pueden necesitar ser prescrito dependiendo de los síntomas y / o hallazgos. Los medicamentos recetados deben tomarse de acuerdo a los instrumentos. Las mujeres que toman anticonceptivos orales deben ser conscientes de que los antibióticos causan estos anticonceptivos a e ineficaz. Otros métodos anticonceptivos deben utilizarse durante el periodo de tratamiento.
- Una vez que el tratamiento se inicia, es absolutamente necesario que el tratamiento de conducto debe ser completado. Uno o más nombramientos pueden ser necesarios para completar el tratamiento. Es la responsabilidad del paciente a buscar atención si ocurre cualquier circunstancia no anticipados o indebidas. Además, el paciente debe seguir diligentemente todas y cada una preoperatoria y / o instrucciones postoperatorias dadas por el dentista y / o personal.

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Se me ha dado la oportunidad de formular las preguntas con respecto a la naturaleza y finalidad del tratamiento de conducto y he recibido respuestas a mi satisfacción. Se me ha dado la opción de buscar este tratamiento de un especialista. Yo voluntariamente asumo todos los riesgos posibles, incluyendo el riesgo de daño sustancial, en su caso, que pueden estar asociados con cualquiera de las fases de este tratamiento con la esperanza de obtener los resultados deseados, que pueden o pueden o no pueden lograr. No hay garantías o promesas se han hecho para mi en cuanto a mi recuperación y resultados del tratamiento que va a prestar a mi. La cuota (s) para este servicio han explicado a mi y son satisfactorios. Al firmar este formulario, estoy dando mi consentimiento libremente para permitir y autorizar al Dr.

\_\_\_\_\_ y sus asociados para hacer cualquier tratamiento necesario o conveniente para mis condiciones dentales, incluyendo cualquiera y todos los anestésicos y / o medicamentos.

\_\_\_\_\_  
Nombre del Paciente

\_\_\_\_\_  
Firma de Padre/Madre o guardian  
O representante autorizado

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
Tooth No.(s)

\_\_\_\_\_  
Witness to Signature

\_\_\_\_\_  
Date